

Sehr geehrte/r Patient/Patientin!

Es wurde Ihnen heute in unserer Ambulanz das Medikament

REVOLADE verordnet

- Die Dosierung ist genau einzuhalten, diese entnehmen Sie bitte Ihrem aktuellen Kurzarztbrief
- Revolade wird einmal täglich eingenommen.
- Schlucken Sie die Tabletten im Ganzen mit einem Glas Wasser mindestens 2 Stunden vor oder frühestens 4 Stunden nach Einnahme von kalziumhaltigen Produkten (u.a. Milchprodukten), Antazida oder bestimmten Mineralergänzungsmitteln (u.a. Eisen, Kalzium, Magnesium, Zink, Selen, Aluminium)
- Wird eine Einnahme ausgelassen bzw. vergessen, darf keine zusätzliche Dosis am nächsten Tag eingenommen werden, sondern die üblich verordnete Dosis!!!

Die Wirkung bezieht sich auf eine Senkung Ihrer Blutplättchen (Thrombocyten). Deshalb sind anfangs öfters Kontrollen Ihres Blutbildes notwendig um die Dosis je nach Thrombozytenzahl anzupassen. Die Termine entnehmen Sie Ihrem Kurzarztbrief.

Wie alle Medikamente kann auch REVOLADE Nebenwirkungen auslösen. Unter der Therapie ist das Thromboserisiko erhöht. Durchfall kann auftreten.

Bitte melden Sie sich bei folgenden Symptomen oder anderweitigen Problemen, die Sie nicht zuordnen können, in unserer Ambulanz:

- Nasenbluten, Zahnfleischbluten, blaue Flecken, Bluthusten
- Kurzatmigkeit, Schmerzen im Brustkorb, Herzrhythmusstörungen
Schwellungen der Beine

Wir sind erreichbar: Montag - Freitag von 8:00 - 15:00
unter: 03842 - 401 - 2821

Außerhalb unserer Ambulanzzeiten werden Sie mit unserer Station verbunden.

Haben Sie sonst noch Fragen oder Probleme, scheuen Sie sich nicht uns darauf anzusprechen.

Ihr Ambulanzteam