



Heioller

Stuhlprotokoll

unter Einnahme von Macrogol 4000,
Movicol, Molaxole, Optifibre

Tag der Einnahme	Dosierung			Stuhlgang?	Typ
Tag 1					
Tag 2					
Tag 3					
Tag 4					
Tag 5					
Tag 6					
Tag 7					
Tag 8					
Tag 9					
Tag 10					
Tag 11					
Tag 12					
Tag 13					
Tag 14					
Tag 15					
Tag 16					
Tag 17					
Tag 18					
Tag 19					
Tag 20					
Tag 21					
Tag 22					
Tag 23					
Tag 24					
Tag 25					
Tag 26					
Tag 27					
Tag 28					
Tag 29					
Tag 30					
Tag 31					

Typ 1
Einzelne, feste Kügelchen
(schwer auszuscheiden)

→ Dosierung erhöhen



Typ 2
Wurstartig,
klumpig

→ Dosierung erhöhen



Typ 3
Wurstartig, mit
rissiger Oberfläche

→ Dosierung ideal



Typ 4
Wurstartig, mit
glatter Oberfläche

→ Dosierung ideal



Typ 5
Einzelne, weiche, glattrandige
Klumpchen, leicht auszuscheiden

→ Dosierung reduzieren



Typ 6
Einzelne, weiche Klumpchen
mit unregelmäßigem Rand

→ Dosierung reduzieren



Typ 7
Flüssig, ohne feste
Bestandteile

→ Dosierung reduzieren



Der Darmbär verdrängt
den Blasentweety!



Heioller



Urologische Ambulanz:
Tel.: 03842/401-2634
Mo – Fr: 7.00 Uhr – 14.00 Uhr